

08-C16-2		クリニカル・パス			
パス名	胃全摘・噴門側胃切除	外来医師		主治医	
		外来看護師		病棟看護師	

目標

心身共に安定した状態で手術が受けられ、術後合併症をおこすことなく早期に社会復帰できる
 術後、経口摂取が充分できる
 通過障害、逆流症状、ダンピング症状がない

ID

月日	月日	月日	月日		月日	月日	月日	
経過	手術前々日 入院時間()	手術前日	当日(術前)	当日(術後) 帰室時間()	術後1日目	術後2日目	術後3日目	
目標	心身共に安定した状態で手術が受けられる		ドレーンからの出血がない		室内トイレまで歩行ができる	棟内歩行ができる	感染徴候がない 排ガスがある(3~5日目)	
検査	術前検査は外来で完了				胸腹部X P (ポータブル) 血液検査		胸腹部X P (放射線科で) 血液検査	
食事	指示食	夕食後絶食 水分は眠前まで可	絶飲食		絶飲食	絶飲食	絶飲食	
観察・処置	体温							
	脈拍							
	血圧							
	排便							
		剃毛は不要 臍処置	ネームバンド記入後、装着 グリセリン浣腸 120ml 手術室にて膀胱留置カテーテル挿入 手術室にて胃管挿入	呼吸音				
				腸ぜん動				
				排ガス				
				SpO2				
				右ドレーン量				
				左ドレーン量				
			疼痛					
			出血					
			尿量					
			酸素 6L 40% 手術終了時から 経過観察表に転記		酸素 6L 40% 8:00まで 胃管抜去(主治医) 創管理	創管理(検創後、ガーゼ除去) 硬膜外麻酔終了後オフ	創管理 膀胱留置カテーテル抜去 硬膜外麻酔チューブ抜去 ドレーン抜去(3~5日目)	
注射・内服	眠前内服薬 ラクソベロン 2錠 マグコロールP 1包 水 300mlで内服 (夕食後)	ヴィーンF 500ml 留置針 (午後手術のみ) 生食 100ml パンスポリン 1g 塩酸モルヒネ 1A (手術室持参) 薬剤ラベル提出	術後点滴 ヴィーンF 500ml x 4 指示量(ml/h) (翌朝10時までで残り返却) 生食 100ml パンスポリン 1g (帰室2時間後)	ソリタT3 500ml x 4 指示量(ml/h) 生食 100ml パンスポリン 1g(朝) 生食 100ml パンスポリン 1g(夕)	ソリタT3 500ml x 4 80ml/h 生食 100ml パンスポリン 1g(朝) 生食 100ml パンスポリン 1g(夕) 薬剤ラベル提出	ソリタT3 500ml x 4 80ml/h 生食 100ml パンスポリン 1g(朝) 生食 100ml パンスポリン 1g(夕)		
行動	制限なし	入浴		床上安静	室内歩行可 下垂座位 清拭	棟内歩行可	清拭	
説明・反応	医師より説明 入院治療計画書 手術同意書 看護師より説明 入院生活について 術前オリエンテーション	麻酔科医師より 麻酔科問診表 薬剤師より 薬剤管理指導		医師より説明 手術の経過について				
追加・備考		初期オーディット			酸素継続の場合は要処置箋			
バリアンス								
巡視								
実施								

08-C16-2		クリニカル・パス			
パス名	胃全摘・噴門側胃切除	外来医師		主治医	
		外来看護師		病棟看護師	

目標

心身共に安定した状態で手術が受けられ、術後合併症をおこすことなく早期に社会復帰できる
 術後、経口摂取が充分できる
 通過障害、逆流症状、ダンピング症状がない

ID

月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日		
経過	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	退院日 (14日~21日目)			
目標	ドレーンの排液が少量で漿液性である 排ガスがある 院内歩行ができる		ダンピング症状がない			経口摂取が充分とれる								
検査														
食事	水分500ml可	食事開始 要食事箋(術式記入) 分割食1度												
観察 ・ 処置	体温													
	脈拍													
	血圧													
	排便													
	排ガス													
	腸蠕動													
	呼吸音													
	右ドレーン量													
	左ドレーン量													
	疼痛													
尿量														
ダンピング														
創管理	創管理	創管理		全抜鉤		留置針抜去								
注射・内服	ソリタT3 500ml x 4 80ml/h 薬剤ラベル提出	ソリタT3 500ml x 4 80ml/h		ソリタT3 500ml x 4 80ml/h		ソリタT3 500ml x 2 (朝、夕) N ¹ リゾックNa ¹ x 2 (朝、夕)		ソリタT3 500ml x 2 (朝、夕) N ¹ リゾックNa ¹ x 1 (朝) 夕点後抜針						
行動	洗髪、足浴 院内歩行可	清拭		入浴可										
説明・反応			栄養士より説明(月日) 栄養指導(ベッド訪問) : : 医師の指示事項 分割食1度、2度 P/S1~2					医師より説明 病理検査結果について 今後の治療について			栄養士より説明(月日) 栄養指導(栄養相談室) : : 医師の指示事項 分割食3度 P/S1~2		医師より説明 退院後の治療について	
追加・備考	必要時(要処方箋) グリセリン洗腸120ml ラクソベロン	指導内容 分割食1度、2度の食事療法 分割食2度の食品構成 献立例 管理栄養士										指導内容 分割食3度の食事療法 分割食3度の食品構成 献立例 管理栄養士		看護師より説明 退院後の療養生活について 外来受診予約 月日 退院時処方 ()日分
褥創対策														
転倒・転落対応策														
基準寝具														
バリアンス														
巡視														
実施														

08-C16-2		クリニカルパス			
パス名	胃全摘・噴門側 胃切除	外来 医師		主治医	
		外 来 看護師		病 棟 看護師	

目 標

心身共に安定した状態で手術が受けられ、術後合併症をおこすことなく早期に社会復帰できる
術後、経口摂取が充分できる

ID

月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
経過	15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20日目	21日目	22日目	23日目	24日目	退院日(日目) 退院時間(:)
目標											
検査											
食事											
観察 ・ 処置	体温										
	脈拍										
	血圧										
	排便										
	疼痛										
	ダンピング										
注射・内服											
行動	入浴可										
説明・反応											
追加 ・ 備考	褥創対策										
	転倒・転落対応策										
	基準寝具										
バリア ンス											
巡視											
実施											