

12-N03-1

クリニカル・パス


パス名	小児腎生検 [全麻・局麻]	外来 医師		主治医	
		外 来 看護師		病 棟 看護師	

目 標

心身共に安定した状態で検査が受けられ、検査後合併症を起こすことなく退院できる

ID

月 日	月 日 ()	月 日 ()	月 日 ()	月 日 ()	月 日 ()	月 日 ()
経過	入院 (検査前日) 入院時間 (:)	当日 (検査前)	当日 (検査後) 帰室時間 (:)	検査後 1 日目	検査後 2 日目	検査後 3 日目 検査後 4 日目 午後退院 時間 (:)
目標	検査に対する不安・精神的ストレスを表出できる 心身共に安定した状態で検査を受けられる		検査後指示された安静が守れる 血尿の増悪がない 38 以上の発熱がない 検査前のHt値より3%以上の低下がない 穿刺部の疼痛、腹痛が自製内である	退院後の注意事項が理解できる 次回受診の必要性と日時、内服薬の必要性と服薬方法、運動制限の程度とその必要性		
検査	2時間法による クレアチニン・クリアランス採血 1時間蓄尿を2回 (セット267) (セット131)	病理組織検査、蛍光抗体法 (SRL)、電顕 (SRL)		採血 (平日はセット131) 休日はセット91、92)	腹部エコー (月 日)	
食事	入院時指示食 [午前の局麻、午後の全麻] 前日夕食後絶食、当日午前7時以降絶食 [午前の全麻] 前日夕食後絶食、前日午後9時以降絶食 [午後の局麻] 当日朝食後絶食、当日午前10時以降絶食		検査から帰室後3時間後に水分試飲 さらに1時間後から食事可	指示食		
	指示食	指示食	指示食			
処置	<2時間法によるクレアチニン・クリアランス> ベッド上安静、時刻は分刻みで正確に記載 蓄尿開始60分前に水300ml 飲水 先ず排尿させて蓄尿開始(時刻 :) 30分後採血 1時間後、1回目の蓄尿終了 (時刻 :) (量 ml) 1時間半後採血 2時間後、2回目の蓄尿終了 (時刻 :) (量 ml)		腎生検 (:) 予定 [局麻] 超音波検査 室にて [全麻] 手術室にて エコー下にて腎生検 用意するもの 丸刃のメス	検査後初回尿 時間 (:) 量 (ml) 性状 () 肉眼的血尿 (なし、あり)	検創	
	体温		体温			
観察	脈拍		脈拍			
	血圧	/ /	血圧	/ / / / / / / / / / / / / / / /		
	呼吸数		呼吸数			
	穿刺部痛		穿刺部痛			
	腹部症状		腹部症状			
	血尿		血尿			
注射・内服	定期薬 抗血小板剤、抗凝固剤は内服中止 (バルサチン、アピタール、コリアン、ワファリン) 継続する内服薬	ソリタ T3 500ml 40ml/hr プレドニンの内服中止 の場合 生食50ml 水溶性プレドニン () mg 30分で点滴 (要処方箋)	生検終了直後から ソリタ T3 500ml トランサミン 1/2A (5ml) アドナ 1/2A (5ml) 40ml/hr	ソリタ T3 500ml トランサミン 1/2A (5ml) アドナ 1/2A (5ml) 40ml/hr 午後4時に点滴除去		
	午前全麻の時には、 朝の内服は中止 安静時間中の絶飲食の 間の内服は、時間をず らして内服					
行動	検査中はベッド上安静 それ以外は制限なし シャワーあるいは入浴	生検後3時間絶対安静 砂嚢2kgを載せ、伏臥位 [: まで] 翌日朝までベッド上安静 トイレ歩行 (可、不可)	病棟内歩行 清拭	制限なし シャワー可	制限なし シャワー可	制限なし
説明	医師より説明 検査の説明 検査 (腎生検) 同意書 全身麻酔の場合 麻酔科医よりの説明 麻酔同意書 看護師より説明 入院の生活 検査後の安静について				医師より説明 退院後の生活について 看護師より説明 次回受診日について 日常生活について 次回受診日予約 (月 日 曜) (時 分)	
追加・備考	発熱疼痛時指示 (要処方箋) ボルタレン坐薬 (25) 但し体重が30kg未満の場合にはアルピニー 坐薬200mg	初期オーディット				
	転倒・転落対策 基準寝具					
パリア ンス						
巡視						
署名						

月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
経過	入院日(検査前日)	当日(検査前)	当日(検査後)	検査後1日目	検査後2日目	検査後3日目 検査後4日目 午後退院	
目標	心身共に安定した状態で検査が受けられる 検査の不安が最小限となる		予定通り検査が終了する 指示された安静が守れる 腹痛・創部の疼痛がない	感染兆候がない		合併症なく退院できる	
検査	午後に1時間ずつ 2回尿をためて ください  30分後と1時間半後に 採血をします 	局所麻酔の場合は超音波検査室で 全身麻酔の場合は手術室で エコーをしながら検査(腎生検)をします		朝、採血を行います 	超音波検査を行います 		
食事	[午前の局所麻酔、午後の全身麻酔のとき] 前日の夕食後は水分のみとなります。当日午前7時以降は水分も飲んではいけません [午前の全身麻酔のとき] 前日の夕食後は水分のみ、午後9時以降は水分も飲んではいけません [午後の局所麻酔のとき] 当日の朝食後は水分のみとなり、午前10時以降は水分も飲んではいけません		検査後、3時間経てば水分をとっても構いません その後、さらに1時間経って から食事が許可になります 	指示食	指示食	指示食	指示食
観察・処置	体温・脈拍・血圧・呼吸数を 測ります 		検査後は5時間経過するまで 1時間毎に体温・脈拍・ 血圧・呼吸数を測ります  検査後の尿は看護師が確認し ますのでお知らせください	創部のガーゼを外します			
注射・内服	抗血小板・抗凝固薬 (バロキサ、アギナル、コリア、 ワファリン)を飲んでいる方の場 合には、入院の6日前から内 服を中止しておいて下さい	点滴が始まります  内服薬については看護師が 説明しますので指示に従って ください	検査後、止血剤の入った点滴 に変わります 	午後4時頃に点滴を 外します 		退院後の薬を お渡しします 	
行動	午後の検査のときは ベッド上で安静に してください  それ以外は 制限ありません 入浴可 	制限ありません	検査後3時間は絶対安静です うつ伏せで重しをのせて 安静にしてください  その後は翌日の朝までベッド 上で安静にして下さい 許可があれば、トイレ歩行は できます 	歩行できます  体を拭きます 	制限ありません シャワーができます 	制限ありません シャワーができます 	退院となります
説明	医師より検査について説明  全身麻酔の場合は 麻酔科医と麻酔看護師より 入院生活と検査後の安静度 について説明があります 				医師より退院後の治療計画に ついて説明があります  看護師より退院後の療養生活について 説明があります  次回受診日 【 月 日 時】 		

- * 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。
- * この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。
- * 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。

全麻の場合	局麻の場合
¥ 75,000	¥ 55,000