

XELIRI+アバスチンを受けられる

○心身共に安定した状態で大腸癌の治療が受けられ、順調に経過する 説明医師

○退院の準備が整い早期に社会復帰できる

様へ (この用紙は、入院時必ずご持参ください)

看護師

| 月日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | | | | |
|-------|--|---|--|---|---|--|---|--|
| 経過 | 入院当日 | | 治療 1 日目 | | 治療 2 日目 | | 退院日 | |
| 目標 | ○心身共に安定した状態で治療が受けられる | | ○副作用の出現がない ○心身共に安定した状態で治療が受けられる | | | | | |
| 検査 | 身長と体重を測定します | | | | | | | |
| 食事 | 食事の変更を希望される方は 早めにお知らせください | | | | | | 夕方退院の方は昼食があります | |
| | 朝食は 自宅で |   |    |    |  () | | | |
| 処置・観察 | 体温・脈拍・血圧を測定します  | | 体温・脈拍・血圧を測定します  | | 体温・脈拍・血圧を測定します  | | 体温・脈拍・血圧を測定します  | |
| | リストバンドを装着します (退院日まで装着します) | | 9時までに点滴(ポート)の針を さします 点滴の針を入れている箇所の観察をします | | 点滴の針を入れている箇所の観察をします | | 点滴の針を入れている箇所の観察をします 点滴が終了したら針を抜きます 退院時にリストバンドを外します | |
| 注射・内服 | 常用薬のある方は申し出てください  | | ゼローダを夕食後から内服開始 塗り薬があります  | | ゼローダを朝夕食後内服 塗り薬があります  | | ゼローダを朝食後内服  | |
| | | | 9時30分頃頃から点滴が始まります ① むかつきどめ  ② アバスチン ③ イリノテカン | | | | ゼローダは2週間服用するので、残りの12日分は 退院時にお渡しします。 | |
| 行動 | 運動制限はありません | | | | | | | |
| | シャワーは可能です  | | | | | | | |
| 説明 | 外来で医師からの説明が 終わられていない方は 医師より説明があります  | | 看護師より説明 点滴投与中の注意点について  | | | | 医師より説明 退院について  | |
| | 薬剤師より説明 内服・点滴について  | | | | | | 看護師より説明 退院後の事について 次回受診日時等について  | |
| | 看護師より説明 入院生活について  | | | | | | | |

* 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。

* 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。

08-Z51-25.26.27.28

2019.10.9 版

京都第一赤十字病院