

シャント拡張術を受けられる (当日入院)

説明医師

様へ

看護師

月日	月 日		月 日			月 日		
経過	当日 (治療前)		当日 (治療後)		2日目			退院
目標	○心身共に安定した状態で治療を受けられる		○治療による合併症の出現が最小限である ○シャントの血流が改善する ○治療後の安静が守られる ○治療後の苦痛が最小限である		○安定した透析を受けることができる			○退院後の生活上の注意点が言える
検査					透析室で透析をします			
食事	食事は治療後になります 水分はとってまかまいません							
	朝食は自宅で							
処置	体温・脈拍・血圧を測ります 		体温・脈拍・血圧を測ります 		医師が創部の状態を観察します 			退院時にリストバンドを外します
	リストバンドを装着します (退院日まで装着します)		治療後は穿刺部・シャントの観察を行います					
注射・内服	持参の内服薬を確認します		抗生剤の点滴があります					
	医師の指示があれば内服は継続です 							
行動	制限ありません 		治療後は安静にしてください 					問題なければ退院です 
			許可があれば歩行できます 					
説明	医師より説明 治療について 		医師より説明 治療の結果について 		医師より説明 退院後の療養について 			
	看護師より説明 入院生活について 		看護師より説明 治療後の注意点について 		看護師より説明 退院後の療養生活について 			

* 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。

* 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。

17-T82-2

2019.10.3版

京都第一赤十字病院